N° 17. Mercredi, 28 Février 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LÉTIENNE. De la sénilité, l'artério-sclérose.
GUELLIOT. Complications des fibromes de l'ovaire.

MÉDECINE PRATIQUE

RENÉ DE GAULEJAC. Méthode de Bier dans les hydarthroses.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. Rhumatisme blennorragique et sérum antigonococcique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — La trypanosomiase chez l'Européen. — Recherches sur le trajet des larves d'ankylostome à travers les organes après infection cutanée. — Les réflexes de la pupille. — Thérapeutique anticancéreuse par inoculation de vaccins bactériens. — Contribution à l'étude des plaies du cœur.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Statistique de la scarlatine. — A propos du pseudo-rhumatisme à entérocoque. — Septicémie à tétragène. — Septicémie streptococcique. Méningite cérébro-spinale. Guérison à la suite d'injections intra-rachidiennes et intra-veineuses de collargol. — Péritonite à pneumocoques chez l'adulte. — Présentation d'un rein polykystique.

Société anatomique. — Hémorragie de la protubérance. — Luxation du pouce. — Fibrome et grossesse. — Cancer oblitérant du gros intestin. — Appendicite à calcul stercoral stratifié. — Salpingo-ovarite tuberculeuse. — Kyste de l'épididyme. — Tumeurs de la parotide. — Arrachement du radius et du cubitus. — Kyste du rein. — Hémiplégie post-dysentérique. — Cysticerque du trapèze. — Athérome chez la vache; origine surrénale. — Pathologie malgache. — Heures des séances.

Société de biologie. — Eosinophilies myéloïdes. — Sérothérapie préventive de l'attaque d'hémoglobinurie paroxystique. Différence des qualités du plasma dans l'hémoglobinurie paroxystique et dans certains cas d'hémoglobinurie paludéenne. — La parotidite des hémiplégiques. — Passage du chloroforme de la mère au fœtus. — Les infections paratyphiques en Tunisie. — Spirochæte dans les lésions de la syphilis héréditaire. — Transformation de la flore bactérienne de l'intestin.

Académie des sciences. — La mesure des rayons X émis en un temps donné. — La radioactivité des sources d'eau potable. — L'aldéhyde formique dans les substances caramélisées. — Influence de la vieillesse sur la pression artérielle. — Action physiologique de la viande crue et de la viande cuite. — Variations de la toxicité du contenu de l'intestin grêle.
Académie de médecine.

ANALYSES

Hématologie. — RICCA-BARBERIS. La morphologie du sang pendant la période cataméniale.
Pathologie générale. — P. K. BROWN. Le rein dans ses rapports avec l'éclampsie puerpérale.
Pathologie chirurgicale. — A. GOSSET. L'ulcère peptique du jéjunum après gastro-entérostomie.
Chirurgie. — D. CHARDON. De l'extirpation transanale du rectum, avec conservation du sphincter.
Obstétrique. — E. ELIKO. Hypothermie due à un accouchement à terme à la fin de la quatrième semaine d'une fièvre typhoïde.
Neurologie et Psychiatrie. — W. SPECHT. Quelques observations sur l'étude des névroses traumatiques. — C. PARIANI. La tétanisation faradique dans quelques maladies mentales.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — R. HORTELOUP. Contribution à l'étude étiologique des othématomes.
Odontologie. — A. BARDEN. Douleurs articulaires unilatérales déterminées par l'éruption d'une dent de sagesse.
Thérapeutique générale. — A. BORRIGLIONE. Traitement des tuberculoses chirurgicales par l'héliothérapie sur le littoral méditerranéen.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Bouteilles à poisons.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

H. BOCQUILLON-LIMOUSIN. Formulaire des médicaments nouveaux pour 1906. — L. TESTUT et O. JACOB. Traité d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

SIROP DE NARCÉINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BOSTON MEDICAL LIBRARY APR 3 1906

BOUTEILLES A POISONS

Les lois françaises modernes sont pour la plupart frappées au coin de la plus humoristique fantaisie. Nos législateurs semblent, lorsqu'ils font une loi, se préoccuper constamment de fournir les moyens de la tourner.

Le pharmacien en France, qui a fait des études spéciales, qui est souvent un chimiste distingué, ne peut débiter les substances toxiques que sur ordonnance de médecin; il est forcé par un règlement très sévère de tenir les toxiques enfermés dans un meuble spécial dit *armoire à poisons* dont il est tenu de garder sur lui la clef. Par contre, le marchand de couleurs ou le débitant de produits photographiques, qui n'ont le plus souvent reçu qu'une instruction sommaire, peuvent livrer à la consommation sans restriction aucune des poisons dont ils ignorent le plus souvent les propriétés dangereuses.

En Angleterre, la pharmacie est libre, le commerce des substances dangereuses n'est pas entouré des précautions imposées en France, théoriquement tout au moins; aussi les Anglais se sont préoccupés des dangers que peut présenter cette liberté.

* * *

Il y a quelques semaines, un journal d'Outre-Manche, *The Daily Mail*, a ouvert un concours entre les fabricants et les inventeurs de la Grande-Bretagne pour la création de types spéciaux de

GLOBULES LAINCAR
TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — LE FLACON : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin. { Phosphate de Gaïacol. — Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. — Tannin.

POLY-FORMIATE de Couturieux
6 à 12 comprimés par jour.
COUTURIEUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

POUGUES TONI-ALCALINE

Plus d'odeur. Plus de dégoût. { VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

bouteilles à poisons. Notre confrère britannique considère que, si les toxiques étaient mis dans des récipients ayant une forme spéciale, les accidents qui surviennent, dans les laboratoires et les pharmacies auraient moins de chances de se produire. Quand tous les liquides, quels qu'ils soient, sont contenus dans des bouteilles semblables, la confusion est facile: une seconde d'inattention



peut avoir de très graves conséquences; si au contraire les toxiques étaient enfermés dans des bouteilles spéciales, il serait impossible à l'employé de se tromper de récipient.

Plusieurs inventeurs, nous dit *La Nature*, ont répondu à l'appel du journal anglais et envoyé des modèles de toutes sortes.

M. Woodland (de Harrow) a inventé une bouteille dont les dispositions sont très simples (fig. 1); ce récipient en verre, conçu dans un esprit très pratique, semble réduire à leur minimum les risques d'accidents. C'est une bouteille munie de deux goulots avec cols allongés, l'un plus haut que l'autre, surmontant le récipient cylindrique où se loge le liquide. Il est impossible d'extraire le poison contenu dans cette bouteille en verre, sans retirer les deux bouchons, parce que le liquide, retenu prisonnier par la pression atmosphérique, ne se verra libéré et ne pourra sortir qu'à la condition que les deux goulots soient ouverts.

M. Greenway (de Warwick), est l'inventeur d'un modèle fort intéressant aussi (fig. 2), mais qui semble présenter moins d'avantages que le précédent. Cet œuf en verre, ou plutôt cet obus qui ne ressemble guère à une bouteille porte son orifice à la partie inférieure. L'opérateur, pour en verser le contenu, a tout le temps de la réflexion; il faudrait qu'il fût bien étourdi pour ne pas être frappé par la forme bizarre de l'objet. Avec ce récipient, le liège ne peut être employé; pour assurer l'étanchéité de la fermeture, il faut un bouchon en verre à l'émeri ou un tampon avec pas de vis. Cela est encore une garantie de plus, pense l'inventeur, parce que l'opération d'ouverture du récipient se trouve, de ce fait, encore retardée.

La figure 3 représente une bouteille envoyée par M. Fred West (de Birmingham). Le col est recourbé et forme un coude sur le sommet du vase; la forme même du flacon dont les quatre côtés se retournent à angles droits, les dispositifs du bouchon sont autant de particularités qui donnent à cette bouteille à poisons un aspect bien spécial. Pour en extraire le liquide, il faut, en outre, donner au récipient une position particulière: car le goulot, on le comprend, ne permettra la sortie du contenu qu'à la seule condition qu'on renverse le contenant dans une certaine direction.

La figure 4 montre un récipient envoyé par un inventeur anonyme; il s'agit d'une bouteille à piquants qui a été tout de suite baptisée le flacon porc-épic. C'est une simple bouteille de forme ordinaire, munie de pointes en verre formant saillie tout autour du cylindre et du goulot.

*
* *

Des dispositifs du genre de ceux que le *Daily Mail* a réuni méritent l'attention, car il y a



certainement une idée intéressante; l'administration de l'Assistance publique s'est préoccupée de cette question il y a quelques années et a préconisé des flacons spéciaux pour les substances toxiques; le décret directorial est en vigueur dans nombre d'hôpitaux parisiens.

P. Desfosses.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En **Ampoules**
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En **Gouttes** (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex.: 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H^2O^2 à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

Nous reproduisons ci-dessous (en changeant les noms) une annonce de praticien qui a paru récemment dans un journal hebdomadaire d'un des États du nord de l'Amérique :

Dr J. Mark Doe.
Médecin et chirurgien.
Le cabinet occupe 4 angles. Ouvert nuit et jour.
Médecines. Fruits et bonbons.
Denrées diverses.
Boissons non alcooliques.
Aliments en conserve.
Déjeuners, etc.
Sherington. Daconsota.

La population du village n'est sans doute pas assez nombreuse pour faire vivre séparément un médecin, un pharmacien, un confiseur, un épicier et un restaurateur! (*Journal of the American medical Assocation*, 4 Novembre 1905.)

Récemment, à l'Association humanitaire américaine, une femme déposa un projet de loi d'après lequel serait considérée comme légale la mort par anesthésie, donnée aux sujets très gravement blessés, aux malades atteints de tétanos, de tuberculose très avancée, de cancer inopérable. Inutile de dire que le vœu fut rejeté.

MYTILÈNE

L'île de Mytilène (Mételin, Lesbos), qui semble décidément vouée aux démonstrations navales des puissances européennes désireuses de remettre un peu d'ordre dans l'anarchie ottomane, est très riche en sources thermales.

Ainsi qu'il arrive constamment dans les îles volcaniques, par exemple à Ischia, à la Réunion, à Saint-Paul, etc., les sources thermales sont localisées au voisinage de la mer, où elles rencontrent, pour remonter au jour, la moindre pression hydrostatique et où se trouvent, en outre, souvent des dislocations de terrain. Les sources thermales de Mytilène forment à l'île une sorte de couronne, dont les trois groupes les plus importants sont ceux de Mételin (la capitale de l'île à l'Est), avec Thermi, Moria, etc., de Molido (l'antique Methymna au Nord) et de Polichnitos (sur le golfe de Kalloni au centre). Ces sources sont surtout chargées de sels analogues à ceux de l'eau de mer.

Les sources de Thermi et de Moria au voisinage de Lesbos ont été très utilisées dans l'antiquité; elles sont situées au Nord de la capitale, sur une côte plantée d'oliviers et semée, comme la banlieue d'une grande ville, d'une quantité de gais villages, où se trouvent quelques-uns des rares restes antiques conservés à Mytilène, notamment les célèbres aqueducs de Moria.

Polichnitos est, au contraire, dans un coin de pays assez aride, auquel les nombreuses colonnes de fumée sortant par les fissures du sol, au milieu de la vallée morne à l'herbe rare, prêtent un aspect sinistre. Ces sources extrêmement abondantes ont, en même temps, une température très élevée de 85°. (*La Nature.*)

JAPON

D'après le *Journal de pharmacie et de chimie* tout soldat japonais porte avec lui un coffret avec des médicaments et des objets de médication les plus nécessaires et, trois fois par jour, avale une pilule de 25 centigrammes de créosote pour se préserver de la dysenterie; ces pilules, dites de l'expédition russe, étaient préparées par la pharmacie militaire, à Tokio, au nombre de 2.000.000 par jour.

LIVRES NOUVEAUX

H. Bocquillon-Limousin, docteur en pharmacie de l'Université de Paris. — *Formulaire des médicaments nouveaux pour 1906*. Introduction par M. Huchard, médecin des hôpitaux. 1 vol. in-18 de 322 pages, cartonné : 3 fr. (Librairie J.-B. Baillière et Fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.)

L'année 1905 a vu naître un grand nombre de médicaments nouveaux : le *Formulaire* de Bocquillon-Limousin enregistre les nouveautés à mesure qu'elles se produisent. L'édition de 1906 contient un grand nombre d'articles sur les médicaments introduits récemment dans la thérapeutique, qui n'ont encore trouvé place dans aucun formulaire, même dans les plus récents.

Citons en particulier : Acide formique, almaténia, alypine, benzoïlperoxyde, broméine, calométol, ceysatite, ektogan, formiates, gentiopicrine, hémoptase, hermitine, hippiol, hopogan, ibogaïne, iodate de soude, musculosine, naftalan, neurodine, olivéol, perborates, quinobromine, quinoforme, quinoléine, santhéose, scopolamine, tannone, théocine, vasenol, zimphène, etc., etc.

Alfred Martinet.

L. Testut et O. Jacob. — *Traité d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales*. Tome second, Paris. (O. Doin, 1906.)

MM. Testut et Jacob viennent de terminer leur magnifique ouvrage. Le tome II qui parle de l'abdomen, du bassin et des membres ne contient pas moins de 766 figures, la plupart en couleur. Un grand nombre représentent des coupes, des schémas et sont parfaitement adaptées à leur but : faire comprendre l'anatomie, éclairer des descriptions bien souvent ardues, malgré la clarté des auteurs. Je ne saurais faire de ce second volume d'éloge plus grand que de dire qu'il est digne de son aîné. J. L. F.

BIBLIOGRAPHIE

1159. — **M. Cassaigneau.** — Essai sur un quatrième état de la matière. 1 vol. in-18 de 227 pages. Prix : 3 fr. 50. (*A. Maloine*, éditeur.)

1160. — **E. Laurent.** — La criminalité infantile. 1 vol. in-18 de 168 pages. Prix : 1 fr. 50. (*A. Maloine*, éditeur.)

1161. — **Ch. Porcher.** — De la lactosurie : *Études urologiques de médecine comparée sur les états de grossesse, de puerpéralité et de lactation chez la femme et les femelles domestiques*. 1 monographie de l'*Œuvre médico-chirurgical*, brochure gr. in-8°. Prix : 1 fr. 25. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : **4'50** *franco.*
Vente en Gros : **Pharmacie MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.
EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'intolérance, ni d'Accidents d'Iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
Le Flacon : 5 fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXINE
PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE
MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique **LIBRE**
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— **Toutes Pharmacies** —
Spécialité réglementée.
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
En Flacons de 30 gr., 60 gr. et 125 gr.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel *après avis favorable de l'Académie de Médecine* (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème infantilisme. Crétinisme.
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — **DÉSINFECTANT** — **ANTISCROFULEUX**

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE

Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE,** *9, Rue de la Perle, Paris.*

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde

DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée,** celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)

TÉLÉPHONE : 517-12

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe de la vessie**, les **rétrécissements de l'urèthre**, l'**engorgement de la prostate**, la **cystite du col**, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'Apiol

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL*, pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches.**

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthesie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/o.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 °/o de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 7 Mars 1906, à 1 heure. — M. Broquin-Lacombe : Contribution à l'étude de l'intoxication aiguë par le chlorure mercurique (sublimé corrosif) ; MM. Gautier, Gaucher, Roger, Richaud. — M. Kahan : De l'alimentation par les décoctions végétales dans les gastro-entérites infantiles ; MM. Gaucher, Gautier, Roger, Richaud. — M. Chaumel : Recherches sur la croissance des enfants des écoles de Paris et des crèches, dispensaires et consultations externes des hôpitaux ; MM. Gaucher, Gautier, Roger, Richaud. — M. Touze : L'appendicectomie préventive, méthode de Longuet ; MM. Roger, Gautier, Roger, Richaud. — M. G. de Saunais de Guermaquer : L'appendicite parasitaire ; MM. Blanchard, Kirmisson, Segond, Teissier. — M. Isautier : Ostéomyélite de l'extrémité supérieure de l'humérus ; MM. Kirmisson, Blanchard, Teissier, Segond. — M. Person : Contribution à l'étude des fistules appendiculo-vésicales ; MM. Segond, Blanchard, Kirmisson, Teissier. — M. Merlot : Contribution à l'étude de l'extension continue dans le traitement des fractures obliques de la jambe : MM. Segond, Blanchard, Kirmisson, Teissier.

Jeudi 8 Mars 1906, à 1 heure. — M. Ferre : De certaines infections secondaires d'origine buccale ; MM. Cornil, Raymond, Dupré, Bezançon. — M. Jolly : Crises hépatiques et tabes ; MM. Raymond, Cornil, Dupré, Bezançon. — M. Gaudemet : De l'intervention chirurgicale dans l'ulcère non perforé de l'estomac ; MM. Le Dentu, Budin, De Lapersonne, Brindeau. — M. Gasse : L'école des mères ; MM. Budin, Le Dentu, De Lapersonne, Brindeau. — M. Chapelle : De l'influence du traumatisme sur la production et l'évolution des tumeurs de l'œil et de ses annexes : MM. De Lapersonne, Le Dentu, Budin, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 Mars 1906. — 2e : MM. Ch. Richet, Broca (André), Macaigne. — 3e (Première partie) (1re série), Oral : MM. Pinard, Mauclaire Cunéo. — 3e (Première partie) (2e série), Oral : MM. Terrier, Lepage, Rieffel. — 3e (Première partie) (3e série), Oral : MM. Kirmisson, Sebileau, Potocki. — 3e (Première partie) (4e série), Oral : MM. Segond, Wallich, Branca, M. Gautier, censeur ; M. Richaud, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu, MM. Dejerine, Teissier, Legry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Claude, Balthazard. M. Roger, censeur ; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Mardi 6 Mars 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique ; MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 3e (Première partie) (1re série), Oral : MM. Le Dentu, Bonnaire, Launois. — 3e (Première partie) (2e série), Oral : MM. Pozzi, Maygrier, Rieffel. — 3e (Première partie) (3e série), Oral : MM. Poirier, Hartmann, Brindeau. M. Hutinel, censeur ; M. Langlois, suppléant. — 5e, Chirurgie (1re Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, De Lapersonne, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Berger, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Gouget, Jeanselme. M. Dieulafoy, censeur ; M. Vaquez, suppléant.

Mercredi 7 Mars 1906. — 3e (Première partie) (1re série), Oral : MM. Pinard, Gosset, Branca. — 3e (Première partie) (2e série), Oral : MM. Terrier, Sebileau, Wallich. — 3e (Première partie) (3e série), Oral : MM. Reclus, Lepage, Cunéo. — 3e (Première partie) (4e série), Oral : MM. Tuffier, Potocki, Rieffel. M. Gariel, censeur ; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 8 Mars 1906. — 1er, Oral : MM. Poirier, Launois, Auvray. — 3e (Première partie) (1re série), Oral : MM. Guyon, Thiéry, Bar. — 3e (Première partie) (2e série), Oral : MM. Berger, Retterer, Bonnaire. — 3e (Première partie) (3e série), Oral : MM. Pozzi, Maygrier, Rieffel. M. Joffroy, censeur ; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 9 Mars 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique ; MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuves pratiques. — 3e (Première partie), Oral : MM. Reclus, Lepage, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Joffroy, Brissaud, Teissier. — 4e : MM. Pouchet, Richaud, Balthazard. M. Gariel, censeur ; M. Claude, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Proust. — M. Dejerine, censeur ; M. Labbé (Marcel), suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), clinique Baudelocque ; MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Branca, suppléant.

Samedi 10 Mars 1906. — 3e (Première partie) Oral : MM. De Lapersonne, Bar, Thiéry. — 4e : MM. Chantemesse, G. Ballet, Vaquez. M. Hutinel, censeur ; M. Langlois suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Thiroloix, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Bezançon. M. Gilbert, censeur ; M. Méry, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Ribemont-Dessaignes, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. le professeur F. Terrier continuera son enseignement clinique à la Pitié. Il reprendra ses leçons, qui auront lieu les mardis et vendredis, à 9 h. 1/2, le vendredi 9 Mars 1906.

Enseignement complémentaire : 1° Exercices cliniques et examens de malades, sous la direction de M. Alglave, chef de clinique, les mardis, à 10 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 2° Chirurgie d'urgence et petite chirurgie, par M. Desjardins, chef de clinique adjoint, les lundis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 3° Maladies des voies urinaires, par M. de Sard, chargé de la consultation, les jeudis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 4° Maladies du larynx, du nez et des oreilles, par M. Stepinski chargé de la consultation, les vendredis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 5° Anatomie pathologique et démonstrations histologiques, par M. Legros, chef du laboratoire, les jeudis, à 11 heures (laboratoire d'anatomie pathologique).

Clinique thérapeutique. — M. le professeur Albert Robin, commencera son *Cours de clinique thérapeutique* le jeudi 8 Mars 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Maladies du système nerveux. — M. le professeur Déjerine, médecin de la Salpêtrière, commencera ses leçons sur les *Maladies du système nerveux*, à la Salpêtrière le mardi 6 Mars 1906, à 5 heures, et les continuera les mardis suivants, à la même heure.

Le mercredi, à 9 h. 1/4, examen des malades à la consultation externe.

Le cours aura lieu dans la salle de la consultation externe.

COURS

Pathologie et thérapeutique générales. — M. Bouchard commencera le *Cours de pathologie et de thérapeutique générales* le jeudi 8 Mars 1906, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Thérapeutique des maladies chroniques.

CONFÉRENCES

Pathologie interne. — M. Thiroloix, agrégé, commencera ses conférences le mercredi 7 Mars 1906, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Maladies des voies respiratoires.

Physiologie. — M. Langlois, agrégé, commencera

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des DOCTrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Préservation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires PAR LE

Sulfo-Rhinol du Dr Fayès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD

Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
} 90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. — P. ANDOUARD, pharmacien, r. Kervégan, NANTES

des *Conférences de physiologie* le lundi 5 Mars 1906, à 4 heures (Grand amphithéâtre de l'École pratique), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Circulation et respiration.

Histologie. — M. A. Branca, agrégé, commencera les *Conférences d'histologie* le samedi 3 Mars 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Les tissus. Les organes de la nutrition. L'appareil uro-génital.

Physique médicale. — M. Broca (André), agrégé, commencera les *Conférences de physique médicale* le lundi 5 Mars 1906, à 5 heures (Amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté), et les continuera les mercredis et lundis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Mosny médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. Berthaux interne de service, commencera le lundi 5 Mars à 8 h. 3/4 du matin un cours élémentaire pratique d'auscultation qui aura lieu tous les jours.

Il sera complet en quinze leçons.

Le droit d'inscription est de 40 francs.

Se faire inscrire le matin auprès de M. Berthaux.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Epreuve écrite. *Séance du 26 Février. — Anatomie pathologique et bactériologie de la méningite cérébro-spinale épidémique. Diagnostic de l'asthme.*

Soixante copies ont été remises.

Le jury s'est réparti de la façon suivante :

Section d'anatomie pathologique. — MM. Moutard-Martin, Tapret, Dalché, Comby, Labadie-Lagrave.

La première séance de lecture aura lieu le jeudi 1er Mars, à la Charité, à 5 heures.

Symptomatologie. — MM. Florand, Thoinot, Roger, de Beurmann, Brault.

La première séance de lecture aura lieu mercredi 28 Février, à 8 heures du soir, à la Charité.

Dentiste des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury pour les places vacantes de dentiste des hôpitaux : MM. Ferrier, Richer, Brault, Delbet, Lannelongue.

Assistance médicale. — Ordre de lecture des copies. — MM. 1, Tourtourat; 2, Croll; 3, Bing; 4, Nau; 5, Barbier; 6, Darin; 7, Beauvy; 8, Bernheim; 9, Vincent; 10, Oguse; 11, Lehmann; 12, Facdouel; 13, Oppenheim; 14, Castex; 15, Hutinet; 16, Luisi; 17, Leichmann; 18, Gouin; 19, Poisson; 20, Friedel; 21, Signoret; 22, Naïs; 23, Hazard; 24, Bonhomme; 25, Poulain; 26, Blondin; 27, Wahlen; 28, Ball; 29, Reinburg; 30, Bourilhet; 31, Hahn; 32, Catz; 33, Petit; 34, Cauzart; 35, Pierart; 36, Eltchaninoff.

Lecture des copies. — *Séance du 23 Février.* — Ont lu : MM. Tourtourat, 18; Bing, 25; Nau, 25; Barbier, 23; Darin, 20. — *Absent* : M. Croll.

Séance du 24 Février. — Ont lu : MM. Beauvy, 29; Bernheim, 24; Vincent, 24; Oguse, 18; Lehmann, 21.

Séance du 26 Février. — Ont lu : MM. Facdouel, 19; Oppenheim, 22; Casteix, 29; Luisi, 19; Leichmann, 22. — *Absent* : M. Hutinet.

Prosectorat. — Un concours pour deux places de prosecteur s'ouvrira le lundi 21 Mai 1906, à midi et demi, à la Faculté de Médecine de Paris.

MM. les aides d'anatomie sont seuls admis à prendre part à ce concours.

Le registre d'inscriptions est ouvert, au Secrétariat de la Faculté, de midi à 3 heures, tous les jours, jusqu'au samedi 5 Mai inclusivement.

Les prosecteurs nommés entreront en fonctions le 1er Octobre 1906; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1910.

Adjuvat. — Un concours pour cinq places d'aides d'anatomie s'ouvrira le lundi 7 Mai 1906, à midi et demi, à la Faculté de Médecine de Paris.

Tous les élèves docteurs de la Faculté, Français ou naturalisés Français, sont admis à prendre part à ce concours.

Le registre d'inscriptions est ouvert au Secrétariat de la Faculté, de midi à 3 heures, tous les jours, jusqu'au 28 Avril inclusivement.

Les aides d'anatomie nommés entreront en fonctions le 1er Octobre 1906; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1909.

Internat. — Anatomie. — *Séance du 23 Février.* — Ont obtenu : MM. Delapchier, 5; Cruet, 10; Rafinesque, 7; Lerat (Henri), 7; Basset, 13; Vaucher, 10; Crémer, 8; Blocq, 6; Mlle Bouteil, 7. — *Absents* : MM. Gauthier (Louis), Crémieu, Bilhaud.

Séance du 24 Février. — Ont obtenu : MM. Burnier, 9; Bénazet, 7; Boulland (Léon), 7; Fimbel, 8; Porée, 9; Lamy, 11; Francey, 7. — *Absents* : MM. Toulant, Chauveau (Paul), Dureau.

La première séance d'oral aura lieu le jeudi 1er Mars, à 5 heures, à la salle des concours de la rue des Saints-Pères.

Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de l'Internat en pharmacie, MM. Lextreit, Villejean, Patein, Héret, Lutz, Schmidt, Vaudin.

Faculté de médecine de Lille. — Le 21 Mai prochain s'ouvrira à la Faculté de médecine de Lille un concours pour l'emploi de prosecteur d'anatomie.

Ecole de médecine d'Amiens. — Un concours s'ouvrira, le 11 Octobre 1906, devant l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens, pour l'emploi de chef des travaux de physiologie à ladite Ecole. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Jeune médecin, ancien externe des hôpitaux de Paris, désire situation médicale ou administrative dans maison de santé ou établissement médical. S'adresser *P. M.*, n° 238.

Vaste local, pour *clinique*, à sous-louer. S'adresser, 15, rue Malebranche, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Marethheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

CONVALESCENCE ✦ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée à 25 %
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob Paris.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

VIN ECALLE

MARQUE DÉPOSÉE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)

DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
DOSE : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPOT Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et tres Pharmacies.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Cie, Phiens, Succrs de F. GILLE

DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0g05 cent. par Dragée.
Sirop : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.



Institut Médical de 1er ordre La Mantega

situé sur les coteaux de **NICE** (120m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE, A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS Ψ CURE D'AIR Ψ PANORAMA MAGNIFIQUE Ψ ASCENSEUR Ψ CHAUFFAGE CENTRAL Ψ LUMIÈRE ÉLECTRIQUE Ψ INSTALLATIONS LUXUEUSES, RIGOUREUSEMENT HYGIÉNIQUES Ψ SOLARIUM, ETC. Ψ CONVIENT AUX TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de **La Mantega, NICE**

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.